


Bécassine des marais

Gallinago gallinago



CLASSE OISEAUX
ORDRE CHARADRIIFORMES
FAMILLE SCOLOPACIDÉS

DESCRIPTION

Limicole de taille moyenne, au long bec.

Longueur : 25 - 27 cm

Poids : 80 - 140 g.

Plumage identique chez le mâle et la femelle adultes : coloré de brun, roux-noir et blanchâtre. Les plumes du dessus du dos forment des lignes longitudinales. Tête brun pâle, avec raie sombre de la narine à l'œil. Sourcil clair marqué. Ventre blanc et flancs tachés de brun sombre.

Détermination du sexe et distinction jeune/adulte par l'examen des plumes de la queue et de certaines plumes des ailes.

STATUT ET RÉPARTITION

Espèce migratrice.

Essentiellement hivernante et nicheuse en petit effectif.

HABITAT

Très diversifié : milieux humides, avec eau libre (25 - 75%) et végétation de moins de 25 cm de hauteur (carex, landes humides,...), également les prairies pâturées.

En période de reproduction : formations végétales basses, humides et/ou marécageuses.

ALIMENTATION

Proies animales en priorité : vers, larves, mollusques, crustacés... Mais aussi des graines de plantes aquatiques.



© Dominique Gest

REPRODUCTION

Moins de 100 couples en France, principalement dans le Massif Central et les régions Bourgogne et Franche-Comté.

Le mâle signale son territoire par un vol nuptial, parades et chant. Un son particulier, le bêlement, est émis par vibration des rectrices externes, lors de piqués.

Nid : au sol, en herbes sèches, généralement sur un petit monticule.

Ponte : 4 œufs gris verdâtres, marqués de brun-roux-gris.

Incubation : 18 - 20 jours

Poussins nidifuges (ils quittent le nid après l'éclosion).

MENACES SUR L'ESPÈCE

Diminution des habitats favorables : particulièrement par le drainage et la mise en culture des prairies pâturées.

Conditions climatiques défavorables : augmentation de la mortalité par froid intense.

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES

Maintien des habitats favorables : milieux humides gorgés obligatoirement d'eau (fine pellicule d'eau).

Fauchage et/ou pâturage sont nécessaires pour que le milieu soit propice à l'espèce.

Zones en réserve : pour assurer la quiétude des oiseaux.

Bécassine des marais

Gallinago gallinago




SUIVI DES POPULATIONS

Le suivi des populations de bécassine des marais en France est mené par le réseau « Bécassines ». L'objectif est de récolter un maximum d'informations sur l'espèce : suivi des effectifs hivernants et migrateurs, estimation des tableaux de chasse, estimation des taux de survie, suivi des habitats.

Dans un premier temps, la priorité a été de mieux connaître les taux de survie, par l'intermédiaire du baguage des oiseaux.

Le baguage nous permet aussi d'obtenir l'origine géographique des oiseaux, leurs déplacements et migrations, la fidélité aux sites d'hivernage. La formation des bagueurs s'est donc mise en place progressivement en France, en liaison avec le Muséum National d'Histoire Naturelle.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉCASSINES BAGUÉES EN FRANCE DE 1998 À 2009



Jusqu'en 2004, en France, les bécassines des marais étaient baguées pour les 2/3 dans le département de la Gironde.

L'augmentation progressive du nombre de bagueurs spécialisés a permis d'amplifier l'effort de baguage et de mieux le répartir sur la France.

En 2009, plus de 1 600 oiseaux ont ainsi été bagués !

La formation de 7 bagueurs a permis à la région Centre de participer aux campagnes de baguage nationales ; ils sont opérationnels dans 4 départements : Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret.

Les bécassines peuvent être capturées avec différentes techniques : filet vertical, nasse, ou la nuit à l'aide d'une épuisette et d'un phare. Les bagues utilisées sont fournies par le Muséum national d'histoire naturelle.

ENTRE 2004 ET 2010, 244 BÉCASSINES DES MARAIS ONT ÉTÉ BAGUÉES EN RÉGION CENTRE

Départements	Bécassine des marais
Indre	22
Indre-et-Loire	19
Loir-et-Cher	107
Loiret	96
Totaux	244

Lors de ces sorties, 47 bécassines sourdes ont également été baguées.

5 bécassines baguées ont été prélevées à la chasse et 7 ont été contrôlées lors d'autres opérations de baguage.

ANALYSE D'AILES

En plus du baguage, le réseau exploite des ailes de bécassines, récoltées par les chasseurs. Ceux-ci conservent des ailes sur des oiseaux prélevés à la chasse et les restituent au réseau, par le biais du Club International des Chasseurs de Bécassines (CICB) et les services techniques des Fédérations départementales des chasseurs.

L'analyse est faite au cours de deux journées et une dizaine de bagueurs chevronnés classent les bécassines selon l'âge, le sexe, l'état de la mue... Ce sont 4 000 à 5 000 ailes analysées chaque année, qui permettent de déterminer les caractéristiques des oiseaux de l'année en cours, ainsi que l'évolution inter annuelle sur plusieurs saisons.

PROTOCOLE GEL PROLONGÉ

Pratiquement chaque année, la région Centre connaît des coups de froid de courte durée et l'accès à la nourriture pour les oiseaux peut devenir problématique.

Un protocole est alors déclenché et certains sites, préalablement choisis en fonction de leurs caractéristiques, sont suivis régulièrement durant toute la période critique, par différents partenaires : ONCFS, FDC, Associations cynégétiques et naturalistes.

Afin de réglementer les prélèvements cynégétiques sur des oiseaux fragilisés et si le besoin est justifié, des arrêtés préfectoraux sont pris dans chaque département en se basant sur les résultats de ce suivi.

CONTACTS



Réseau national ONCFS / FNC / FDC
« Bécassines »
39, Boulevard Albert EINSTEIN
CS 42355 - 44323 NANTES
Mail : gilles.leray@oncfs.gouv.fr

Délégation Interrégionale Centre - Île-de-France
Mail : dr.centre-iledefrance@oncfs.gouv.fr

Fédération Régionale des Chasseurs du Centre
Mail : frc.centre@wanadoo.fr