


Pigeon colombin

Columba oenas



CLASSE OISEAUX

ORDRE COLUMBIFORMES

FAMILLE COLOMBIDÉS

DESCRIPTION

Longueur du corps : 32 - 34 cm

Poids : 250 - 350 g.

Plumage adulte identique chez les deux sexes :

gris-bleu cendré, avec des reflets verts irisés sur les côtés du cou. Barres alaires noires, plus ou moins marquées.

Bec rose à la base, jaune-orangé en pointe.
Pattes rouge vif.

Plumage juvénile :

plumage à dominante gris-brun. Bec gris.

STATUT ET RÉPARTITION

Espèce sédentaire et migratrice. Hivernant.

Répartition morcelée en France.

Accompagne souvent les vols de pigeons ramiers.

HABITAT

Milieux forestiers souvent âgés, riches en arbres creux, bois clairs, parcs, bocages, zones urbaines, falaises...

ALIMENTATION

Graines, feuilles, tiges, bourgeons divers, consommés essentiellement en milieu agricole.

Des invertébrés peuvent compléter son régime alimentaire.

Poussins nidicoles (ils restent au nid après l'éclosion).

Les jeunes au nid sont nourris par les adultes, avec le « lait de pigeon » (sécrétion du jabot).



© Dominique Gest

REPRODUCTION

Reproduction : De février - mars à septembre.

Nid rudimentaire dans des cavités diverses : arbres, murs, falaises...voire terriers.

4 - 5 nichées/an - 2 œufs/nid **Incubation :** 16 - 18 jours.

Prédation importante sur les juvéniles (martre).

MENACES SUR L'ESPÈCE

Destruction de l'habitat de nidification : arrachage de vieux arbres, haies...

Consommation de semences agricoles traitées lors des semis.

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES

Sauvegarde des vieux arbres creux et de l'habitat de nidification.

Mise en œuvre de suivis adaptés à l'espèce.

Pigeon colombin

Columba oenas



L'objectif est de connaître la tendance démographique sur le long terme, des populations nicheuses et hivernantes. Ce suivi est réalisé au printemps et en hiver, par des observations réalisées à partir de 5 points fixes, répartis tous les km, sur des circuits de 4 km de longueur.

FRANCE : environ 1000 circuits
CENTRE : 68 circuits.

Le Pigeon colombin fait partie :

- des 17 espèces suivies dans le cadre du protocole NICHEURS ;
- des 13 espèces suivies dans le cadre du protocole FLASH HIVERNANT.

Suivi de l'abondance des NICHEURS


Les circuits sont prospectés 2 fois chaque année, en avril et de mi-mai à mi-juin. Les oiseaux entendus sont notés durant 10 minutes, au cours des 2 premières heures suivant le lever du soleil.

En France, 1148 contacts ont été notés de 1996 à 2010. La tendance globale est de - 1,8 %. L'espèce est considérée comme stable au niveau national.


En région Centre, 163 contacts ont été obtenus de 1996 à 2010, soit pratiquement 15 % des contacts nationaux. L'indice d'abondance a augmenté de 50,1 % de 1996 à 2010. Elle est considérée régionalement en augmentation modérée. L'abondance des nicheurs est remarquable au Nord de la région.

L'espèce, au niveau de l'évolution de ses effectifs nicheurs en Europe, est considérée comme en augmentation modérée (Suisse, Belgique, Allemagne) et stable (Royaume Uni, Hollande, Espagne).


DISTRIBUTION ET D'ABONDANCE DU PIGEON COLOMBIN AU PRINTEMPS 2010 en France



en région Centre



ÉVOLUTION DE L'INDICE D'ABONDANCE DU PIGEON COLOMBIN EN FRANCE ET EN RÉGION CENTRE DE 2000 À 2010



La courbe présentée pour la région Centre, nous montre une évolution en dents de scie, due en particulier à la difficulté de bien identifier son chant assez discret. Cependant, la droite des tendances nous indique une augmentation régulière des effectifs nicheurs recensés.



Pigeon colombin

Columba oenas

Suivi de l'abondance des HIVERNANTS

Ce suivi permet d'évaluer les variations interannuelles de l'abondance et la répartition d'espèces migratrices terrestres au cours de la période d'hivernage en France.


Les observations visuelles sont réalisées sur les mêmes circuits et mêmes points qu'au printemps.

Le suivi est effectué entre le 12 et le 21 janvier, entre 10h et 12h, durant 5 minutes.




DISTRIBUTION ET D'ABONDANCE DU PIGEON COLOMBIN EN JANVIER 2010

en France



en région Centre




En France, 3630 contacts ont été notés, de 2000 à 2010. La tendance globale est de -18,9 %.

Le statut de l'espèce est considéré comme incertain.

En région Centre, 319 contacts ont été obtenus de 1996 à 2000, soit pratiquement 9 % des contacts nationaux.

La carte du suivi flash hivernant 2010 nous montre une très nette répartition par taches.

ÉVOLUTION DE L'INDICE D'ABONDANCE DU PIGEON COLOMBIN EN FRANCE ET EN RÉGION CENTRE DE 2000 À 2010



La courbe d'évolution des indices d'abondance régionaux indique un pic important en 2008. L'échantillon est trop faible pour pouvoir appréhender une tendance réelle des populations de l'espèce. L'espèce est considérée comme incertaine en région Centre.

Pigeon colombin

Columba oenas

BAGUAGE

Des pigeons colombins sont bagués chaque année, dans toute la France depuis les années 2000. En 2010, le total des pigeons colombins bagués en France, s'élève à 2287.

La région Centre participe à cet effort de baguage et des agents des FDC et des SD ont, après formation préalable, posé 608 bagues sur cette espèce entre 2001 et 2010 :

Départements	stade poussins	stade volants
Cher	8	-
Eure-et-Loir	416	2
Indre-et-Loire	2	-
Loir-et-Cher	158	14
Loiret	4	1
Totaux	588	20

Notons la présence de l'espèce et l'importance de l'effort de baguage sur cette espèce, dans les départements d'Eure et Loir et du Loir et Cher.



CONTACTS



Réseau national ONCFS / FNC / FDC
« Oiseaux de passage »
Maison Guende - rue du Musée
84390 SAULT
Mail : denis.roux@oncfs.gouv.fr

Délégation Interrégionale Centre - Île-de-France
Mail : dr.centre-iledefrance@oncfs.gouv.fr

Fédération Régionale des Chasseurs du Centre
Mail : frc.centre@wanadoo.fr