


Pluvier doré

Pluvialis apricaria



CLASSE OISEAUX

ORDRE CHARADRIIFORMES

FAMILLE CHARADRIIDÉS

DESCRIPTION

Longueur : 26 - 29 cm.

Poids : 160 - 280 g.

Plumage adulte hivernant :

dessus de la queue, dos tête, et poitrine dorés, striés de taches et liserés noirs. Ventre clair.

Extrémités des ailes pointues et noires.

Identique pour les deux sexes.

Plumage juvénile : plus uniforme que l'adulte, avec des motifs plus fins.

Souvent vus en groupes importants, en formation serrée en vol, généralement en milieux ouverts.

Vol rapide.

Se mêlent fréquemment aux vols de vanneaux huppés.

STATUT ET RÉPARTITION

Espèce migratrice sur l'ensemble de la France.

Hivernant principalement sur le quart Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Bassin parisien. La région Centre est une des principales zones d'hivernage.

HABITAT

Milieux ouverts : cultures d'hiver, labour, prairie...

En hiver, se rassemble en groupes importants, sur des milieux ouverts.



ALIMENTATION

Insectes, vers, baies, graines et diverses graminées.

REPRODUCTION

Ne niche pas en France, mais principalement dans le Nord de l'Europe.

Nid : petite cuvette garnie d'herbes.

3 - 4 œufs.

Incubation : 28 - 31 jours par les deux adultes

Jeunes nidifuges (ils quittent le nid après l'éclosion).

MENACES SUR L'ESPÈCE

Intensification des pratiques agricoles et d'élevage : artificialisation des prairies, drainage, réduction des possibilités alimentaires de l'espèce.

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES

Maintien du suivi annuel des effectifs hivernants en France.

Maintien des cultures d'hiver (céréales) et des prairies rases.

Pluvier doré


Pluvialis apricaria

Suivi de l'abondance des HIVERNANTS


Ce suivi permet d'évaluer les variations interannuelles de l'abondance et la répartition d'espèces migratrices terrestres au cours de la période d'hivernage en France.

Le suivi est effectué entre le 12 et le 21 janvier, entre 10h et 12h, durant 5 minutes.

DISTRIBUTION ET D'ABONDANCE DU PLOUVIER DORÉ EN JANVIER 2010




en région Centre



49735 contacts ont ainsi été obtenus entre 2000 et 2010 au niveau national et 20183 contacts obtenus durant la même période en région Centre, soit plus de 41% des contacts nationaux.

La courbe des indices d'abondance, établie de 2000 à 2010, est obtenue à partir d'un échantillon peu important. Elle ne permet pas de fournir des tendances d'évolution fiables. Elle nous indique simplement une légère tendance à la baisse, mais à prendre avec beaucoup de précaution.

ÉVOLUTION DE L'INDICE D'ABONDANCE DU PLOUVIER DORÉ EN FRANCE DE 2000 À 2010



Recensement hivernal « VANNEAU - PLOUVIER »

Ce recensement, coordonné par le CNERA avifaune migratrice, permet d'obtenir des estimations des effectifs hivernants de vanneaux huppés et de pluviers dorés, par région et dans l'ensemble du pays. Secondairement, il s'agit aussi de collecter des informations sur leur répartition et leur utilisation des milieux.

Le recensement doit être fait entre les 5 et 12 janvier inclus. Le recensement est annulé en cas de forte vague de froid, car il est remplacé par l'application du protocole « Gel prolongé ».

Un échantillon de communes, identique chaque année, est recensé en France, dans les régions favorables à l'hivernage de l'espèce, en particulier la région Centre. L'objectif est de recenser aussi exhaustivement que possible les pluviers et les vanneaux présents sur le territoire communal au moment du recensement. Ceux-ci ont lieu pendant tout ou partie de la journée, entre l'aube et le crépuscule.

Pluvier doré

Pluvialis apricaria



SUIVI DES POPULATIONS


Le ou les observateurs parcourent l'ensemble des voies de circulation de chaque commune en voitures et notent, sur une fiche, les effectifs de Pluviers dorés présents, ainsi que les sites et/ou cultures fréquentés. Les recensements de Pluviers dorés ont lieu chaque année en France, depuis 2005.

Les courbes nationale et de la région Centre nous indiquent une diminution régulière des effectifs hivernants recensés.

Les causes en sont principalement les conditions climatiques nationales durant la période du 12 au 21 janvier, avec présence ou non de coups de froid (températures inférieures à 0 °C), plutôt qu'une réduction progressive des effectifs de Pluviers dorés hivernants en France.

La région Centre, particulièrement le département d'Eure-et-Loir, comptabilisent souvent un pourcentage important des oiseaux recensés en France.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE PLUVIER DORÉ EN FRANCE ET EN RÉGION CENTRE DE 2005 À 2010



CONTACTS



Réseau national ONCFS / FNC / FDC
« Oiseaux de passage »
Maison Guende - rue du Musée
84390 SAULT
Mail : denis.roux@oncfs.gouv.fr

Délégation Interrégionale Centre - Île-de-France
Mail : dr.centre-iledefrance@oncfs.gouv.fr

Fédération Régionale des Chasseurs du Centre
Mail : frc.centre@wanadoo.fr