


Tourterelle des bois

Streptopelia turtur



CLASSE OISEAUX

ORDRE COLUMBIFORMES

FAMILLE COLOMBIDÉS

DESCRIPTION

Longueur : 25 - 28 cm. **Poids:** 100 - 180 g.

Le plumage adulte est identique chez les deux sexes :
tête gris bleu, côtés du cou avec raies blanches et noires sur 3 - 4 rangées, plumes du dessus de l'aile maillées de brun-roux, poitrine rosée, queue foncée avec bords blancs. Ailes longues et pointues.

Juvéniles : assez uniformément brun sale et blanc- gris.

STATUT ET RÉPARTITION

Espèce migratrice.

Nicheuse.

Uniquement présente en période de reproduction sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des zones les plus élevées des massifs montagneux.

Assez commune.

Farouche et souvent difficile à voir.

HABITAT

Paysages ouverts, en particulier plaines cultivées, avec arbres, buissons, haies.

Apprécie les zones arbustives.

Ne fréquente que très rarement les milieux urbains.

ALIMENTATION

Essentiellement graines de plantes adventices.

Ne consomme que très peu d'insectes.

Se nourrit à terre ou directement sur les plants.

REPRODUCTION

Monogame. Nid dans les arbres et arbustes de moins de 2 m.

Ponte : 1 - 2 pontes/an 2 œufs généralement/ponte

Incubation : 13 - 14 jours. Femelle et mâle se succèdent pour couvrir

Période de reproduction courte : avril-mai à juillet - août.

Jeunes nidicoles (ils restent au nid jusqu'à l'envol), nourris par le « lait de pigeon » (sécrétion du jabot) durant les premiers jours.

MENACES SUR L'ESPÈCE

Dégradation des milieux de nidification :

zones arbustives, bocages, haies...

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES

Maintien de zones avec cultures diversifiées.

Maintien des zones arbustives, bocages et haies. Entretien des haies hors période de reproduction.

Réduction de l'emploi des produits phytosanitaires qui limitent les possibilités d'alimentation en graines d'adventices.

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur



L'objectif est de connaître la tendance démographique sur le long terme, des populations nicheuses. Ce suivi est réalisé au printemps, par des observations réalisées à partir de 5 points fixes, répartis tous les km, sur des circuits de 4 km de longueur.

FRANCE : environ 1000 circuits
CENTRE : 68 circuits.

La Tourterelle des bois fait partie des 17 espèces suivies dans le cadre du protocole NICHEURS.


Suivi de l'abondance des NICHEURS

Les circuits sont prospectés 2 fois chaque année, en avril et de mi-mai à mi-juin. Les oiseaux entendus sont notés durant 10 minutes, au cours des 2 premières heures suivant le lever du soleil.


En France, de 1996 à 2010, 28 827 contacts ont été notés. La tendance globale est de - 9,7 %. L'espèce est considérée en déclin modéré.

La carte des nicheurs 2010 nous montre une répartition géographique hétérogène, avec une nidification de l'espèce plus importante dans la partie Ouest de la France. En Europe, elle est en diminution au Royaume-Uni, en Hollande, en Belgique. Elle présente des signes de déclin en Suisse et en Allemagne et est stable en Espagne. Elle connaît une protection intégrale au Royaume-Uni et en Hollande.


DISTRIBUTION ET D'ABONDANCE DE LA TOURTERELLE DES BOIS AU PRINTEMPS 2010 en France



en région Centre



ÉVOLUTION DE L'INDICE D'ABONDANCE DE LA TOURTERELLE DES BOIS EN FRANCE ET EN RÉGION CENTRE DE 2000 À 2010



Au niveau national et en région Centre, on observe une chute importante de l'indice d'abondance en 2008 et 2010. L'espèce est considérée en déclin modéré.

En région Centre, le déclin des effectifs nicheurs est plus important, en particulier depuis 2007. Depuis 1996, l'indice d'abondance a diminué de 12,4 %. L'espèce y est cependant considérée comme stable.



Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

BAGUAGE

Des tourterelles des bois sont baguées chaque année, dans toute la France depuis les années 2000. En 2010, 3 642 tourterelles de bois ont ainsi été baguées en France.

La région Centre participe à cet effort de baguage et des agents des FDC et des SD ont, après formation préalable, posé 205 bagues sur cette espèce entre 2001 et 2010 :

Départements	stade poussins	stade volants
Cher	5	2
Eure-et-Loir	54	12
Indre	18	9
Indre-et-Loire	7	0
Loir-et-Cher	16	2
Loiret	37	44
Totaux	136	69



CONTACTS



Réseau national ONCFS / FNC / FDC
« Oiseaux de passage »
Maison Guende - rue du Musée
84390 SAULT
Mail : denis.roux@oncfs.gouv.fr

Délégation Interrégionale Centre - Île-de-France
Mail : dr.centre-iledefrance@oncfs.gouv.fr

Fédération Régionale des Chasseurs du Centre
Mail : frc.centre@wanadoo.fr